


ALGORITMO DE VACUNACIÓN ANTINEUMOCÓCICA EN LA NEUMONÍA EN PACIENTES SEGÚN NIVEL DE RIESGO

Vera López Ana, Cano Guerrero José M., López Ruiz Nuria, Sánchez Rodríguez Rosario, Pino Pazos Luisa, Ramírez Palacín Yolanda

UGC Algeciras Norte, AGS Campo Gibraltar



Modelo algoritmo grupos de riesgo

INTRODUCCIÓN:

La infección por streptococcus pneumoniae produce diversas patologías: neumonía, otitis media, sinusitis, hasta otras más graves como la Enfermedad Neumocócica Invasora (ENI), meningitis o sepsis.

Se han introducido modificaciones en la vacunación del adulto frente al neumococo para los pacientes nacidos en 1954 y aquellos pacientes incluidos en los grupos de riesgos, con diferentes pautas de vacunación, descritas en las instrucciones recibidas en julio de este año de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

ALGORITMO/ CUADRO RESUMEN: dada la complejidad de la existencia de diferentes pautas de vacunación según grupos de riesgos, se hace imprescindible tener un algoritmo o cuadro resumen de fácil manejo para que sea más fácil el manejo de la acupuntura frente a neumococo.

OBJETIVOS:

Disminuir el riesgo de infección por neumonía y de complicaciones en nuestros pacientes

Facilitar la elección de la pauta de vacunación según riesgo del paciente, a los profesionales, mediante un instrumento sencillo y seguro

Disminuir el riesgo de error en la elección de pauta de vacunación y catalogación de riesgo del paciente de contraer neumonía.

MATERIAL Y MÉTODO:

- Diseño de Algoritmo
- Realización de sesión clínica para su distribución entre profesionales y explicación de método de trabajo
- Establecer soportes de ayudas: folletos para pacientes, información sobre vacunación en grupos de riesgo en nuestra página de Facebook y cartelería

RESULTADOS:

Se realiza sesión clínica el 19 de julio de 2019 y se presentan las nuevas instrucciones recibidas de Consejería de Salud y el algoritmo. Los profesionales ven el algoritmo como un instrumento muy sencillo y que evita errores en la catalogación de riesgo del paciente y en la elección de pauta de vacunación.

CONCLUSIONES

Aumenta la vacunación de pacientes de riesgo durante el mes de agosto, dicho aumento se medirá a los 3 meses, para disponer de datos más amplios ya que actualmente se encuentran muchos profesionales de vacaciones.

Es necesario realizar más sesiones informativas aclaratorias conforme se incorporen resto de profesionales de sus vacaciones, y es necesario tener instrumentos que faciliten nuestra labor y disminuyan la variabilidad en la práctica clínica.

BIBLIOGRAFÍA:

- Instrucción DGSPyOF-3/2019, Julio 2019, Junta de Andalucía
- Consenso sobre la vacunación anti-neumocócica en el adulto con patología de base, J. J. Picazo, et al
- Incidence of adult community acquired pneumonia in primary care in Spain (neumo-es-risk project).